



VACINAÇÃO

O HOMEM E O HPV

Actualmente, estão recomendadas 3 doses:

- 1ª dose
- 2ª dose - 2 meses após a 1ª dose
- 3ª dose - 6 meses após a 1ª dose

A administração da vacina deve ser registada no Boletim Individual de Saúde.

Vacinas comercializadas em Portugal:

Bivalente - contempla os serotipos 16 e 18.

Tetravalente - contempla os serotipos 16, 18, 6 e 11.

Na impossibilidade de cumprir este esquema, a vacinação deve ser completada no prazo de um ano

CONTACTOS:

www.dgs.pt
www.saudereprodutiva.dgs.pt
Centro de Saúde da Lapa
Centro de Saúde local




A infecção por HPV no homem raramente evolui para doença grave.

Se notar verrugas genitais, deve:

- Recorrer a uma consulta (Médico de Família, Consulta de Infecção de Transmissão Sexual, Urologista).
- Alertar a/o sua/seu parceiro/a, que deverá também ser observada/o.
- Usar preservativos nas relações sexuais.

⇒ A vacinação no homem, embora possa ser efectuada pontualmente por indicação médica, não é recomendada.

PAPILOMA VÍRUS HUMANO



- O QUE É?
- O QUE FAZER ?

O QUE É O HPV?

🦠 O **PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV)** é um vírus DNA, com mais de 100 tipos diferentes.

As Infecções pelo vírus do Papiloma Humano são comuns. A maioria não provoca doença, desaparecendo espontaneamente.

Alguns tipos do vírus provocam lesões na pele vulgarmente conhecidas como verrugas, outros causam verrugas genitais.

O vírus pode também ser transmitido através das relações sexuais e estar presente durante alguns anos no colo do útero, sem provocar doença. Pode, no entanto, levar a lesões pré-malignas que, se não forem tratadas, tendem a evoluir para cancro.

Só alguns tipos de HPV causam cancro do colo do útero.

A infecção por HPV não provoca infertilidade ou problemas durante a gravidez.

Ainda que não assegure uma protecção completa, o uso de preservativos diminui o risco de contrair uma infecção por transmissão sexual como, por exemplo, o HPV.

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

RASTREIO

Os exames de rastreio são usados para identificar, numa população saudável, os indivíduos com doença que não apresentam ainda qualquer sintoma.

Após o início das relações sexuais, a mulher deve fazer regularmente um exame ginecológico e o rastreio do cancro do colo do útero.



O rastreio do cancro do colo do útero , permite a sua detecção precoce e aumenta a possibilidade de tratamento

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

VACINA

A vacina não protege contra todos os tipos de HPV que podem provocar cancro, mas previne o cancro do colo do útero associado aos 2 tipos de HPV mais frequentes, .

A idade ideal para a vacinação é entre os 12 e os 13 anos



Para além de efectuar com regularidade o rastreio do cancro do colo do útero, outras medidas preventivas, também devem/podem ser tomadas:

- Usar preservativo nas relações sexuais.
- Ter bons hábitos nutricionais,
- Não fumar